

**عنوان:** بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی پنداشتی مراقبت از خود بر کیفیت زندگی و وضعیت متابولیک بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین مراجعه‌کننده به مرکز آموزش دیابت در شهر تبریز

**نام دانشجو:** عاطفه قنبری

**رشته و مقطع تحصیلی:** Ph.D آموزش پرستاری

**استاد راهنما:** دکتر زهره پارسایکتا

**اساتید مشاور:** دکتر مهوش صلصالی، دکتر سقراط فقیه زاده

**شماره پایاننامه:** ۱۰۴

**مقدمه:** پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه تجربی است که به منظور "تعیین تاثیر آموزش بر اساس الگوی پنداشتی مراقبت از خود بر کیفیت زندگی و وضعیت متابولیک بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین مراجعه‌کننده به مرکز آموزش دیابت در شهر تبریز" از طریق نمونه‌گیری تصادفی انجام شده است.

**روش کار:** ابزار گردآوری داده‌ها شامل: پرسشنامه مشخصات فردی - اجتماعی، بررسی و شناخت نیاز مراقبت از خود درمانی (نیازهای کلی مراقبت از خود، نیازهای مربوط به انحراف از سلامت)، بررسی و شناخت نیروی مراقبت از خود، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی اختصاصی (رضایت از درمان و مشکلات ناشی از دیابت) و وضعیت متابولیک (نمایه توده بدنی، کلسترول، تری‌گلیسرید، هموگلوبین گلیکوزیله، قند خون، دفعات افزایش و کاهش قند خون، علائم و نشانه‌ها، فشار خون سیستول و دیاستول) و انجام آزمایشات تشخیصی در بیماران دیابتی می‌باشد.

در این تحقیق یک گروه بطور تصادفی و بتدریج (۱۳۷ نفر) انتخاب شدند در مورد آنها پیش آزمون شامل تکمیل فرم پرسشنامه و انجام آزمایش HbA1C اجراء شد، سپس پژوهشگر اقدام به ارائه آموزش گروهی نمود و پس از یکماه مجدد آموزش بصورت فردی برای تک تک واحدهای مورد پژوهش اجراء گردید و پس از شش ماه از ورود واحدهای مورد پژوهش آزمون نهایی برای ۶۳ نفر شامل تکمیل فرم پرسشنامه و انجام آزمایشات خونی صورت گرفت.

**یافته‌ها:** در آزمون فرضیه اول "آموزش بر اساس الگوی پنداشتی مراقبت از خود بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی موثر است" یافته‌ها نشان داد که آموزش بر اساس الگوی پنداشتی مراقبت از خود سبب تفاوت معنی دار در امتیازات کسب شده از کیفیت زندگی قبل و شش ماه بعد از آموزش گردید ( $P = 0.0001$ )، از طرف دیگر آموزش تفاوت معنی داری را در نمرات اجزاء کیفیت زندگی شامل عملکرد جسمی ( $P = 0.01$ )، درد و ناراحتی ( $P = 0.02$ )، فعالیتهای روزمره ( $P = 0.001$ )، خواب ( $P = 0.005$ )، سلامتی کلی ( $P = 0.0005$ ) ایجاد نمود. در کیفیت زندگی اختصاصی نیز بر مشکلات ناشی از دیابت ( $P = 0.0001$ ) تاثیر داشته است.

در آزمون فرضیه دوم "آموزش بر اساس الگوی پنداشتی مراقبت از خود بر وضعیت متابولیک بیماران دیابتی موثر است" یافته‌ها نشان داد که آموزش بر تری‌گلیسرید ( $P = 0.03$ )، هموگلوبین گلیکوزیله ( $P = 0.0001$ )، قند خون ( $P = 0.0001$ )، دفعات افزایش قند خون ( $P = 0.001$ ) و علائم و نشانه‌ها ( $P = 0.001$ ) موثر می‌باشد.

به منظور ارائه یک مدل پنداشتی مراقبت از خود بر اساس یافته‌ها و تعیین نیازهای مراقبت از خود درمانی اقدام به تحلیل با روش آنالیز مسیری گردید. یافته‌ها نشان داد که از میان نیازهای کلی مراقبت از خود (وضعیت مایعات و دفع) و از میان نیازهای مربوط به انحراف از سلامت (تاریخچه قبلی انحراف از سلامت) بر کیفیت زندگی موثر است، وضعیت مایعات بیماران دیابتی نیز بر وضعیت متابولیک آنان موثر می‌باشد. اجراء نیروی مراقبت از خود شامل آگاهی از خود کنترلی، قضاوت - تصمیم‌گیری و عملکرد بر وضعیت متابولیک موثر بوده ولی بر کیفیت زندگی تاثیری ندارد.

**واژه‌های کلیدی:** الگوی پنداشتی مراقبت از خود، کیفیت زندگی، بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین