

عنوان: عوامل تنفس زا و روش‌های سازگاری بیماران دیالیز خونی و صفاقی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)، تبریز ۱۳۸۸

نام دانشجو: روناک آهنگر

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد - پرستاری

اساتید راهنمای: کبری پرون - فرحتناز عبدالزاده

استاد مشاور: دکتر مرتضی قوجازاده

شماره پایان‌نامه: ۲۴۳

مقدمه: بیماران کلیوی مرحله آخر با تنفس زاهای متعددی برخورد می‌کنند که بر سطوح عملکرد جسمی و روانی- اجتماعی آنها تاثیر خواهد گذاشت. آنها باستی به وابستگی به گروه و تجهیزات پزشکی عادت کرده و عوامل تنفس زای خود را تحت کنترل در آورند. هدف از این مطالعه شناخت و مقابله عوامل تنفس زا و روش‌های سازگاری بیماران دیالیز خونی و صفاقی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقایسه‌ای است. کل بیماران دیالیز خونی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز (۷۰ نفر) به روش سرشماری و به همان اندازه‌نیز بیماران دیالیز صفاقی که رضایت و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند به روش نمونه کیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ها، شامل مشخصات فردی- اجتماعی، مقیاس تنفس زا های بیماران دیالیز خونی (HSS) و صفاقی (PDSAS) و مقیاس سازگاری جالوبک (JCS) بود که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که عمدۀ عوامل تنفس زای گروه دیالیز خونی مربوط به احساس خستگی، بی‌حوصلگی، هزینه درمان، نقل و انتقال برای درمان، و در گروه دیالیز صفاقی مربوط به تعویض مکرر، بی‌حوصلگی، طولانی بودن زمان مورد نیاز برای دیالیز بوده همچنین عمدۀ روش‌های سازگاری گروه دیالیز خونی شامل: دعا کردید و یاد به خدا توکل کردید، آن وضعیت را قبول کردید چون کار زیادی نمی‌توانستید انجام دهید، امیدوار بودید که مشکل بر طرف خواهد شد، و در گروه دیالیز صفاقی شامل: دعا کردید و یاد به خدا توکل کردید، سعی کردید وضعیت را عوض کنید، به طرف شدن مشکل امیدوار شدید، میباشدند. اختلاف میانگین امتیاز تنفس هر دو گروه از نظر آماری معنی دار بود ($P < 0.01$)، به طوریکه سطح تنفس در گروه دیالیز خونی از گروه دیالیز صفاقی بیشتر بود. نتایج مقایسه روش‌های سازگاری نشان داد که اختلاف میانگین استفاده از روش‌های سازگاری در دو گروه از نظر آماری معنی دار بود ($P < 0.01$ ، به طوریکه میانگین امتیاز استفاده از روش‌های سازگاری در گروه دیالیز خونی از گروه دیالیز صفاقی بیشتر بود). نتایج بررسی ارتباط یورسی ارتباط بین استفاده و تاثیر روش‌های سازگاری نشان داد که امتیاز استفاده از روش‌های سازگاری موثرتر بیشتر بود.

بحث و نتیجه: نتایج مطالعه حاضر نشان داده که اکثر بیماران در دو گروه مکرا با عوامل تنفس زا برخورد داشته و نیاز به مقابله دارند. با توجه به اهمیت شناخت عوامل تنفس زا و روش‌های سازگاری موثر توصیه می‌شود که باشناسی مهارت‌های سازگاری موثر از طریق برنامه‌های آموزشی می‌توان فرآیند سازگاری بیماران دیالیزی را با عوامل تنفس زا تسهیل نمود.

کلمات کلیدی: دیالیز خونی، دیالیز صفاقی، عوامل تنفس زا، روش‌های سازگاری